癸巳新刊御藥院方

癸巳新刊御藥院方卷第十一

較勘無差

治婦人諸疾門

芎藭湯　治產後去血過多運悶不省及傷胎去血多崩中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多不止懸虛心煩眩運頭重目暗耳聾滿塞舉頭欲倒並皆治之

芎藭三兩　當歸三兩去蘆頭洗切焙乾

右為麤末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓稍熱服不計時候

詵詵丸　治衝任不和子臟怯弱或經墮胎後氣不復常丸藥常服調和衝任滋益氣血

熟地黃　當歸各二兩　延胡索

澤蘭葉各一兩半　川芎　赤芍藥

白薇　人參　金釵石斛

牡丹皮各一兩

右件爲細末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒送下或溫粥飲亦得

黑神丹　治婦人產後大發熱消渴不止煩燥不休或汗病後胃脘受水者並宜服之

黑附子(炮裂去皮臍一兩) 天麻(去蘆頭) 天南星(炮裂)

桂(去麤皮) 半夏(漿水煮焙乾) 麻黃(去根節)

乾薑(炮已上各一兩半) 草烏頭(二兩炮裂去皮臍)

白附子(炮黃色半兩) 麝香(去毛細研一兩)

天雄(二兩慢火上炙熱好酒內蘸如此七返無令折藥力更用童子小便內蘸七返擲一坑子約深五寸先用熱火坑內炙乾去火坑內灑酒約半升天雄在內用磁椀蓋定周迴泥了不致漏氣冷定取出用之)

右一十一味各修製訖一處碾爲細末煉蜜和搜成劑約擣千餘杵丸如彈子大發熱渴用寒水化服欲出汗熱酒化服汗病後胃脘硬煖水依

前用澄水化服一丸

延齡護寶丸　治婦人血臟虛損經候過多每行時暴下不可禁止因成崩中連日不斷致五臟空虛失色黃瘦崩竭暫止日少復發不耐動揺小勞輒劇此藥但澄心服必有大効

禹餘糧不二兩醋燒淬七次　龍骨　人參

桂　赤石脂　紫石英研

熟乾地黃　杜仲去粗皮剉炒　桑寄生

續斷　吳白芷　芎藭

當歸剉炒　金釵石斛去根剉炒　遠志去心

白茯苓去皮　阿膠炒　牡蠣煅

五味子　艾葉炒已上各一兩

右二十味同爲細末煉白沙蜜和丸如梧桐子大

每服四五十丸溫粥飲下空心食前

活血散　治衝任氣虛經事不調或多或少或前或後並治之

當歸　川芎　白芍藥

延胡索各四兩　肉桂去粗皮一兩

右爲麤末每服抄五大錢水一盞半煎至七分去滓稍熱食後服

螽斯丸　治婦人無子術金城大守范羅謹上臣驗此術若服藥四十日無子請戮臣一家以令天下醫人賜子丸

附子生去皮臍　白茯苓去黑皮　白薇

半夏湯洗七次　杜仲去皮炒　桂心

厚朴去皮炒　秦艽已上各三錢　防風

乾薑生　牛膝　沙參已上各二錢

細辛去苗半兩　人參四錢

右件為細末煉蜜和丸如小豆大日服五丸空心任下如覺無益稍加丸數為度如服七日後陰

覺有娠三日後不可更服臣妻年二十七歲無子服此藥有娠又殘藥與前太子中舍宇文妻李氏年四十無子服此藥十三日有娠此藥名螽斯丸屢用屢驗此方不可不廣傳與人夫不在家不可服

靈寶散　治血氣刺痛引兩脇疼痛及痃癖刺氣

丁香　木香　乳香各一錢半

當歸　玄胡索　白芍藥各半兩

右件爲細末每服一錢溫酒調下食前

五聖丸　調益榮衛滋養氣血治衝任氣虛損月水

不調臍腹疼痛崩中漏下血瘕塊硬發歇疼痛妊娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒熱

當歸　熟乾地黃　川芎

白芍藥各一兩　生乾地黃二兩

右件爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服六七十丸食前溫酒送下

人參荊芥煮散　治婦人血風勞氣攻刺疼痛四肢無力不思飲食多困黃瘦胸膈痞滿經水不利心

多怔忪並治之

荊芥穗四兩 柴胡 秦艽去蘆頭外去泥

肉豆蔻 白芷 黃耆

鱉甲醋炙黃洗淨 桔梗 官桂去皮各二兩

當歸 川芎 蓬莪茂

麥門冬去心 芍藥 人參

茯苓 海桐皮 甘草炙

枳殼麩炒去穰 熟乾地黃 酸棗仁

木香各一兩 沉香 檳榔各半兩

右件羅為末每服三錢水一盞生薑三片烏梅一

盞煎至七分溫服一日四五服如覺臟腑熱即空心食前服小便多即食後臥時服如患氣血漸立得消化亦治丈夫風勞病其功不可具述

茯苓湯　治妊娠惡阻嘔逆惡心四肢疼痛惡聞食氣惱怒煩悶多顛墜宜安胎調勻血脈

白茯苓去皮　旋覆花各二兩

生乾地黃本方用二兩餘副使添半兩計用二兩半

陳橘皮一兩半　細辛去苗本方用一兩半餘副使減半兩只用一兩

芎藭　人參　芍藥

桔梗去蘆頭炒　甘草炒令赤色各一兩半

右件一十味麤擣篩每服三錢匕以水一盞同煎
至六分去滓溫服不拘時候

保安丸 治婦人產前產後三十六種冷血風半身
不遂手腳疼痛諸疾並宜服之

赤茯苓(去黑皮) 牡丹皮 白芍藥(各三分)
不茱萸 沉香(各一分) 人參(去蘆)
桂(去麤皮) 當歸(去土切焙) 牛膝(酒浸)
吳白芷 木香 藁本(去蘆)
麻黃(去根節) 川芎 細辛(淨擇)
蔓荊子(去白皮剉) 藿香葉 甘草(炙剉)

寒水石煅　防風去蘆頭　桔梗去蘆頭

蟬殼去足翅已上十七味各半兩　馬鳴退炙

生乾地黃各一兩

右件二十四味杵羅為細末煉蜜和丸如小彈子大每日空心用溫酒化下一丸療八風十二痺痛瘕乳中風淋血聚并治胎不安子死腹中不過三九生下死胎胎衣不出一丸便出產前產後痢并赤白帶下及嘔逆填心痰氣煩滿一丸差產前產後腹中污痛遶臍下如刀刺相似者一丸便止入難月便一日一服至產下可覺疼

痛產前傷寒中風體如板者以熱煎麻黄湯化下一丸立效經脉不通或頻併來或赤白喫食無味瘦惡乍寒乍熱面赤脣焦手足煩痛遍身黑點生血斑者一切病服此藥悉愈每服一丸細嚼空心溫酒送下

大保生丸　調和本氣主療諸疾滋補榮衛久服之大有功益

生乾地黄　人參　藁本

白茯苓　當歸　赤石脂

白朮　玄胡索　肉桂去皮

白薇　白芍藥　川芎

白朮　甘草炙　牡丹皮

沒藥已上各半兩

右件爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸溫酒化下空心食前服

六神湯　治脾氣不和榮衛不足怠墮困倦可嗜飲食服之補眞養氣進美飲食充實肌膚並宜服之

當歸　熟地黃　白芍藥

川芎　地骨皮　黃耆各一兩

右件六味搗篩爲麤末每服五錢水一盞半煎至

[illegible]

當歸地黃丸　治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸　熟地黃　川芎

白芍藥各二兩　南玄胡索　牡丹皮各一兩

人參　黃耆各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸米飲送下食前日進二服常服平養氣血

人參荊芥散　治婦人血風氣滯身體疼痛頭昏目澀心忪煩悶寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神

不爽或月水不調臍腹疞痛痃癖塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進

荊芥穗　人參　白朮

桂　生乾地黃　柴胡

鱉甲塗酥炙黃去裙襴　枳殼麩炒去瓤　羚羊角鎊

酸棗人微炒已上各一兩半　芎藭　當歸

防風　牡丹皮　赤芍藥

甘草剉炒已上各一兩

右爲麤末每服五錢水一盞半入生薑三片煎至八分去滓熱服不計時候

必效散　治婦人本經不調及崩漏不止

棕皮燒　木賊去節各二兩燒灰存性研細　麝香一錢研

右研勻每服二錢溫酒調下食前

旋覆花丸　治停痰積飲在脇下久而不愈漸成大癖心腹脹滿羸瘦不能食雖食不消化善噫乾嘔大小便或澁或利在腸中動搖有水聲或口乾好飲水漿兩脇疰痛服之必安久服除根

旋覆花去梗　桂皮去皮　枳實麩炒去穰

人參各一兩　乾薑炮　芍藥

白朮各一兩二錢半　赤茯苓　狼毒

川烏頭炮去皮臍各一兩七錢半　芫花醋浸一日炒乾

吳茱萸湯洗去滑炒黃色　橘皮去穰　細辛去苗葉

大黃煨炒　黃芩去黑心　厚朴去粗皮生薑製

葶藶隔紙炒各七錢半　甘遂炒半兩　礬石火燒赤一兩七錢半

右二十味為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一十丸漸加至二十丸溫酒下不拘時候日進二服

虎骨散　婦人血風走注疼痛

虎骨酥炙　敗龜醋炙　當歸

桂去皮　地龍去土炒　牛膝去苗酒浸

湯盥　　　　　　　　　　　　　　　　威靈仙去　延胡索
自然銅煆醋淬各一兩七遍
右一十味同爲細末每服一錢匕熱酒調下每日
一服
禹餘糧散　治氣血傷衝任虛損崩傷帶漏久而不
斷或下如豆汁或成片如肝或五色相雜或赤白
相兼臍腹冷痛面體痿黃心忪悸動發熱多汗四
肢困倦飲食減少
禹餘糧煆　　伏龍肝　　赤石脂
白龍骨　　牡蠣　　烏魚骨

朴去皮　浮石各等分

右件同爲細末每服三錢煎烏梅湯調下食前服

白多加牡蠣龍骨烏魚骨亦多加赤石脂禹餘

糧黄多加伏龍肝桂心隨病加治

當歸良薑散　補養血氣去心腹疼痛脇肋脹滿經

絡不調或帶下赤白腰脚冷痛一切因疾

高良薑五兩　厚朴去皮薑製二兩　當歸

桂去皮各三兩

右用紗羅子羅每服二錢水一盞入艾十葉同煎

至七分去滓熱服食前

滋陰丹　養血和氣調順榮衛充成肌膚活血住痛

久服大補衝任勻順月經神良不可具述

熟乾地黃　生乾地黃　白茯苓

人參各二兩　黃耆　甘菊花

枸杞　丹參　柏子人炒

白芍藥各一兩

右件為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸

至六十丸米飲下空心食前日進二三服

抽刀散　治婦人心腹臍肋疼痛不可忍者產前後

用尤佳

川烏頭炮去皮臍　牡丹皮　芍藥

乾薑炮　桂心　沒藥

當歸此方無分兩

右為細末每服二錢熱酒調下不過三服輕可一服效產後加紅花

廣胤丹　治久無子息方

黃耆切細焙一兩半　人參上黨者去蘆焙一兩　川續斷剉焙

澤蘭葉去枝焙　熟地黃焙乾焙　牡丹皮揀焙焙

延胡索焙　白芍藥　川芎

白薇已上各一兩　嫩鹿茸燎去毛酥酒塗炙乾別杵秤一兩

白茯苓 去黑皮一兩　當歸 去苗洗切焙乾秤一兩
肉蓯蓉 酒浸軟去皴皮切焙乾秤一兩　防風 去苗及叉尾者秤一兩
藁本 去苗土秤一兩　華細辛 去苗葉土吹焙羅過秤一兩
陳皮 湯浸去白焙乾秤一兩　蓬莪茂
京三稜 二味各和白麵裹煨灰火中煨熟去麵乾熟并碎秤各一兩
乾薑 炮裂秤一兩半　木香 半兩　肉桂 去麤皮秤半兩
山茱萸 半兩　甘草 剉炒秤二兩　黑附子 炮裂去皮臍秤三錢
覆盆子 去萼枝扶淨秤二兩
右二十七味同擣為細末煉蜜和丸如彈子大每
服一粒空心食前細嚼溫酒下日進三服有孕

佳服臣祖母常服此藥而生七男以此常合此

藥與人服餌而皆應効

沒藥丸　治婦人本經不調肌瘦發熱飲食減少

沒藥　莨菪子　乾薑

蒼术　川芎　熟乾地黄

白芍藥　當歸各一兩　血竭半兩

右件除血竭沒藥外並㕮咀先炒莨菪子焦黑色次下乾薑炒令黄次下蒼术微黄色次下川芎等藥並令微黄色與血竭沒藥等同爲細末醋炙麵糊爲丸如梧桐子大每服五六十丸漸加

至八九十九空心食前溫酒送下或醋湯亦得日進二服

滋血湯　治婦人皮聚毛落心肺俱損血脉虛弱月水愆期益氣養血調進飲食

人參　白茯苓去皮　熟乾地黃

川芎　當歸　白芍藥

乾山藥　黃耆已上各一兩

右件爲麤末用馬尾羅子羅每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

當歸血竭丸　治婦人產後惡物不下結聚成塊心

胸痞悶及臍下堅痛

當歸二兩炒剉　血竭二兩　蓬莪茂二兩炮

芍藥二兩　五靈脂四兩

右件爲細末醋麪糊和丸如梧桐子大每服四十丸温酒下或温粥飲下空心食前

地髓煎丸　治婦人經氣不調虛煩發熱肌體瘦悴形羸困弱飲食不進欲成勞病

熟乾地黃不以多少

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸温粥飲送下空心食前

八珍湯　和榮調衛理順陰陽滋血養氣進美飲食

當歸　川芎　赤芍藥

熟地黃　人參　茯苓

甘草炙　縮砂人各等分

右爲麄末每服三錢水一大盞入生薑七片棗三枚去核同煎三五沸去滓放溫空心日進二服

萬病丸　治婦人久虛血氣衰少怠惰嗜臥飲食不進精神不足

熟乾地黃　當歸各四兩

右爲細末蜜麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸

溫粥飲送下空心食前

滋陰湯　治婦人血熱氣虛經候不通或血聚支體麻木肌熱身重倦怠少力將成勞瘵不可妄行破血湯丸宜滋養潤利

馬鞭草　荊芥各四兩　官桂

川芎　白芍藥　當歸各二兩

枳殼三兩　牡丹皮一兩

右爲麄末每服四錢水一盞半入烏梅半枚同煎至一大盞去滓溫服食後

加味四物湯　治婦人衝任不調臍腹疼痛或月事

失於不米及衝任太過致使陰陽不和或發寒熱
漸減飲食欲成勞病

當歸　地黃　芍藥

川芎各一兩　柴胡半兩　黃芩二錢半

右㕮咀服食依前

滋榮丸　治婦人本經衰少愆期不來及有血結成
塊臍下堅硬疼痛不治並宜治之

熟乾地黃　人參　五味子

赤芍藥　當歸　遠志去心

白茯苓去皮　牡丹皮　桂心

藁本已上各一兩　防風　卷柏

細辛　山藥各半兩　白朮二錢

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸食前空心溫酒下日進二服

地黃膏子　治婦人本臟血氣衰少困倦無力或發熱飲食減少並宜服之

熟乾地黃八兩　淨蜜一斤八兩

右將熟乾地黃爲細末同蜜熬成膏子丸如梧桐子大每服四五十丸溫酒送下米飲亦得食前或作膏子酒化服或不飲酒者白湯化服亦得

當歸沒藥丸　治婦人真氣虛憊血氣衰少不能榮養致使經氣不來或發寒熱飲食減少怠墮嗜臥以致虛勞

當歸（剉炒）　沒藥　川薑（炮）

天仙子（炒黑色）　蒼朮（炒黃色）　芍藥

熟乾地黃　川芎（已上各等分紀二兩為科）

右件八味為細末麵糊為丸如桐子大每服五十丸溫粥飲送下食前

經候

論曰經者常候謂其一身之陰陽愆伏知其安危

故其來必以月太過不及皆爲不調過於陽則前期而來過於陰則後期而至其有作多作少斷絕不行崩漏不止亦由陰陽衰盛寒熱爲邪詳說於下若經候作多作少或前或後腹痛而色不澤久不治之漸至虛損俱令人斷產變生他病此由衝任虛弱後致榮衛不調或陰氣乘陽胞寒氣冷血不運行故作少或陽氣乘陰血熱流散故令作多當調其陰陽順其血氣宜服

禹餘糧丸

禹餘糧煅醋淬　龍骨

桂皮

川烏頭炮　紫石英　人參

桑寄生　杜仲去皮炒　五味子

遠志去心　澤瀉　當歸切洗焙

石斛去根　茯苓　乾薑炮各二

牡蠣燒　甘草炙　川椒去目炒出汗

右爲末煉蜜和丸如梧桐子大米飲下二十丸漸

加至三十丸日三服

治小兒諸疾門

玉柱杖散　治急慢驚風發不時省

全蠍七个　薄荷葉十四　麻黃七條

右三味以溫湯浴潤以兩葉蠍一箇川麻黃一條縛定炒至焦黑次入白术半將牛蒡自然汁浸透焙乾

右同爲末每服半錢煎丁香柿蒂湯調下不拘時候

珍珠丸　治風化痰

珍珠米　朱砂　雄黃

輕粉　蠍稍各一錢

右爲細末粳米飯和丸如粟米大每服二十丸不拘時候薄荷湯下

金頂麝香散　治小兒百日內發搐

麝香一字匕　蝎尾去毒半錢匕　薄荷葉半錢匕

蜈蚣一字匕　牛黄末一字匕　青黛末一字匕

右同研勻棗肉就新綿上塗貼顖上

三味天漿子散　治小兒慢驚風

天漿子　白殭蠶炒　乾蝎各二十個炒

右為細末每服一字煎麻黄湯調下或薄荷湯調下無時

五味天漿子散　治小兒急慢驚風

天漿子一錢　朱砂末一錢　龍腦一錢

蜈蚣一十條炙　乾蝎一十個炒

右爲細末每服一字煎薄荷湯調下不拘時候

透聖餅子　治小兒慢驚風癎涎多咽喉不利手足搐搦

天麻　使君子去皮　白殭蠶炒

白附子炮　天南星各一分炮　乳香

青黛　蠍稍炒　膩粉

水銀各一錢　黑鉛半錢與水銀結沙子　麝香

腦子各半錢　無食子一對去皮

右爲細末麵糊和爲丸如梧桐子大捏作餅子每服一餅子用薄荷湯化下食後臨睡服量兒大

小加減

引風湯　治大人厥顛口有涎沫牵引口眼手足少小驚瘈瘲日數十發醫所不治

大黃生　乾薑生　龍骨各四錢

桂三錢　甘草炙　牡蠣煅各一錢

凝水石生　滑石　赤石脂

白石脂　石膏　紫石英各六錢

右爲麤末每服三錢匕水一盞半煎取七分清汁食後臨卧溫服小兒以意斟酌與服

聚寶膏　治小兒一切驚風壯熱涎多精神昏憒日

睛上視手足搐搦饒啼多驚

朱砂二兩　犀角屑　西琥珀

玳瑁各一分　南硼砂　龍腦各一錢

牛黃　麝香各半錢　人參

茯苓各三分　紫河車二兩　甘草生一兩

銀箔五片研　茯神一分　珍珠一分

右爲細末煉蜜和丸如雞頭大每兩作三十丸每

服半丸煎薄荷葉湯化下乳後常服安魂定魄

治驚寧神響音聲利咽嗌解諸毒凉上焦療驚

搐

導赤散　治小兒心熱其證目赤口中氣溫合面睡

或上竄咬牙

生乾地黃　木通　甘草各二兩

右爲麤末每服三錢水一盞入竹葉三片煎至八

分食後溫服量大小加減

雙金散　治天瘹驚風目久不下眼見白睛兼角弓

反張聲不出者

蜈蚣一个去頭足尾真酥塗慢火炙黃置砧子上

面南立川竹刀子當脊縫中停劃作兩个左

邊者入一左貼內寫左字右邊者亦入一貼

子內寫右字不得變錯大悞矣

麝香一錢細研分二處先將左邊者同於乳鉢內研作細末却入在左字貼內收起別用乳鉢將右邊字者入麝香同研極細却入右字貼內收不得相犯

右以細葉筒子取左字貼內藥少許吹在左邊鼻右亦如之用藥不可多若眼全未下更量添些小其眼隨手便下即止大有神效

利膈丸　治風勝痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛四兩半生半炒　皂角不蚛肥者去皮子塗酥炙黃二兩

槐角子半兩　青皮半兩去白　半夏湯洗七次焙乾一兩

石爲末薑汁麵糊和丸如黍米大每服十五

丸至二十丸溫生薑湯下

聖惠烏犀丸　治小兒驚風癇病及諸風手足搐搦

不定

烏犀角屑　天南星炮製　白附子炮製

乾蠍微炒　天麻各一分　白花蛇半兩酒浸去皮骨焙乾秤

巳上六味爲細末以無灰酒一小盞同入銀器

內煎令稠則入後七味同和爲丸

牛黃　麝香　膩粉

龍腦　水銀以棗少許研星盡各一分　朱砂研水飛

虎睛一對酒浸酥炙為末

右七味都研合勻入前膏子為丸如麻子大每服

三丸用竹瀝下不拘時候量大小以意加減

聖惠牛黃丸　治小兒中風手足拘攣身體強直口

禁壯熱

牛黃　犀角屑　麝香

羚羊角屑　胡黃連　朱砂

鈎藤　雄黃　水銀棗肉研

乾蠍　天竺黃已上各一分　烏蛇半兩酒浸去皮骨炙

右爲末蒸餅和丸如黍米大每服五丸薄荷湯下
量兒大小加減服之

大水銀珠丹　治小兒驚風壯熱涎多發搐手足搐
搦目睛上視及風蘊痰實心膈滿悶嘔吐痰涎

黑鉛（煉十遍秤三兩與水銀結沙子分爲小塊同甘草十兩水煮半日候冷取甘細研）

水銀（三兩）　鐵粉（三兩）　朱砂（半兩飛）

膩粉（一兩）　天南星（三分炮爲末）

右同研細以麵糊爲丸如麻子大每一歲兒服一
丸用薄荷蜜湯利爲度未利再服乳食後

大天南星丸　治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上

覷口眼相引牙關緊急背脊強直精神昏塞逐日
不省

滴乳香　龍腦　牛黃各半錢

朱砂三錢　麝香一錢半　天南星半兩牛膽製

人參　天麻　防風各一分

蠍頭去　十四个湯浸後內北微

右杵研爲末煉蜜爲丸如雞頭大每兩作五十丸
每服一丸荊芥薄荷湯化下看兒大小以意加
減服不計時候

開胃丸　治小兒臟腑怯弱內受風冷腹脇脹滿腸

鳴泄利或青或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒

腹痛

木香　蓬莪茂　白朮

人參　當歸剉炒各半兩　麝香一分細研

白芍藥一分

右為末都研勻湯浸炊餅為丸如黍米大每服十五丸溫米飲下又一法煉蜜和搜每兩作五十丸每服一丸米飲化下不拘時候

導飲丸　消乳食化痰涎

荊三稜三兩一錢　蓬莪茂三兩一錢　青皮去白

陳皮去穰　白朮各一兩半　檳榔
枳殼去穰麩炒　木香各一兩　白茯苓半兩
半夏一錢生薑六錢製
右為細末煉蜜和丸每兩作五十丸不拘時候淡
生薑湯化下一丸或溫水亦得

涼驚丸　治風熱相搏手足搐搦目睛上視
草龍膽末　防風末　青黛末
鈎藤末各三錢匕　牛黃　麝香各一錢匕
黃連末二錢匕　龍腦一錢匕
右同研勻麪糊為丸如粟米大每服三五丸至一

一十九煎金銀湯送下溫服

人參橘皮湯　治小兒吐乳令乳母服此藥

人參一兩　橘皮去白一兩　乾生薑半兩

右為麤末每服三錢水一中盞煎至六分去滓溫分二服服了良久令兒飲乳大效

水銀褊丸子　治小兒驚風壯熱涎甚喘麤或發搐搦或目睛上視及因乳哺不節胸滿嘔逆精神迷悶發癎痰瘀並宜服

水銀一兩　黑鉛一兩與水銀結沙子　乾蠍全者

膩粉各一分　黃明膠炙令黃炒一錢　鉛白霜研一分

青黛研一分　百草霜一分研

牛黃研一分　巴豆一兩去皮心膜醋煮令黃

右爲細末入研藥末勻以陳粟米飯和丸如菉豆

大捏褊每一歲兒服一丸二歲服二丸三歲服

三丸四歲巳上服四丸用乾柿湯下薄荷湯亦

得更審虛實加減服利下青黏滑涎爲度乳食

後服不得化破

百當膏　治一切積聚心腹疼痛年月深久者皆治

之百歲至一歲皆服

丹砂研　膩粉研各半　水銀

鉛結各一錢炒　牛黃　龍腦

鉛霜研各二錢　粉霜研　陽起石研各二分

黃蠟半兩　巴豆肥者一百二十粒去皮心膜研出油取霜

蝎梢炒一分　半夏一錢湯洗七次二味并羅為末

右件一十三味合研極勻鎔蠟并熟蜜少許同和

成膏旋丸如梧桐子大小兒如黍米大每服三

丸至五丸量大小虛實加減服吐逆藿香湯下

取熱積生薑蜜水下取冷積乳香湯下風涎薄

荷湯下便利米飲下

罷膽丸　治驚風諸癎壯熱昏憒神志不寧痰涎壅

塞或發搐搦目睛上視涎皆治之

雄黃飛研一錢半　青礞石研一錢　鐵粉一錢半

朱砂飛研三錢　地黃火煅醋淬飛二錢　蝦蟆灰一錢半

右同研勻水浸蒸餅和丸如梧桐子大每服一丸煎薄荷水磨剪刀股化下日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱丸用銀粉藥切須慎之

木香化滯丸　治小兒宿食不消心腹滿脹嘔吐壯熱

木香　京三稜　青橘皮去白各一兩

補骨脂二兩　黑牽牛四兩炒令黑羅取麵二兩

右五味搗羅為末滴水和丸如黃米大每服一二十丸溫水下不拘時候

金珠化痰丸　治痰熱安神志除頭痛眩運心忪恍惚胸膈煩悶涕唾稠黏痰實咳嗽咽嗌不利

金箔為衣二十片　辰砂二兩飛研　皂角子仁炒微黃色一兩

白礬光明者於鐵器內熬令汁盡放冷研一兩　鉛白霜細研一兩

天竺黃研一兩　生白龍腦細研半兩　薑製半夏四兩

右為細末入研藥勻生薑汁麵糊和丸如梧桐子大小兒如黍米大每服十丸至十五丸食後臨

臥生薑湯下

洗浴菖蒲湯　散風截癎

菖蒲二兩用一寸九節者　防風　荊芥穗各二兩

石膏　梅根各一兩

右作搗羅為麤末每用五匙頭水三椀煎三五沸

適寒溫浴兒先洗頭面次浴身體為佳

大青膏　治小兒傷風其候伸欠煩悶口中氣熱或

偎人惡風脈浮

大青生一分　白附子生一錢半　蠍尾生去毒半錢

朱砂一字匕　青黛一錢　麝香一字匕

烏蛇稍肉半錢 天竺黃一字匕

右爲細末朱砂研入生蜜和成膏月內兒粳米大

一歲皂子大餘以意加減用溫薄荷湯化下

惺惺散 治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目

澁多睡咳嗽喘麤鼻塞清涕

桔梗 細辛去葉 人參去蘆頭

甘草炙 白茯苓去皮 瓜蔞根

白朮各一兩 加川芎一兩

右爲末每服一錢水一小盞入薄荷三葉同煎至

四分溫服如要和氣入生薑煎服不計時候

人參羌活散　治小兒寒邪溫病時疫瘡疹頭痛體

痛壯熱多睡下治潮熱煩渴痰實咳嗽

羌活去苗　獨活去苗　柴胡去苗

人參去蘆　芎藭去苗　枳殼去瓤麩炒

白茯苓去皮　甘草炙各二兩　前胡去蘆頭

桔梗　地骨皮去土　天麻酒浸炙乾

右為散每服一錢以水七分入薄荷少許煎至五

分去滓溫服不計時候

大鎮心丸　治小兒精神不爽寢寐多驚心忪恐悸

四肢戰掉舉動欲倒狀類暗風或煩躁而多啼退

驚風化痰涎壯心氣益精神

生犀角鎊末　鐵粉研各一兩　羚羊角鎊末

龜甲鎊末　赤箭各半兩　牛黃研

茯神去木　遠志去心　真珠末研

人參　桂去粗皮　蛇蛻皮炙令焦黃

天竺黃研　龍腦各一分研　麝香研

菖蒲各半兩　丹砂研半分　金箔研

銀箔研各五十片

右一十九味擣研爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸至二丸食後臨卧薄荷湯化下更量大

小加減

牛黃散　治心肝臟風熱致眼偏視宜服之

牛黃一錢細研　犀角屑　甘菊花

天麻　槐子　人參去蘆頭

芎藭　防風去蘆頭　車前子

決明子　黃芩剉　蔓荊子已上各半兩

朱砂一分細研　龍腦一錢細研　甘草一分炙赤剉

羚羊角屑半兩

右件藥搗細羅為散入研了藥同研令勻每於食後以竹葉湯調下一錢臨臥再服

羚羊角散　治眼風邪所攻睡人不正顏觀常偏宜服

羚羊角屑一兩半　犀角屑一兩　龍腦一分細研

牛黃一分細研　朱砂半兩細研　赤芍藥

甘菊花　細辛　防風去蘆頭

酸棗人微炒　沙參去蘆頭　蔓荊子

玄參　人參去蘆頭　桃人去赤皮各三兩

天竺黃半兩細研　密蒙花一兩　甘草半兩炙微赤剉

右件藥擣細羅為散入研了藥更研令勻每於食後以竹瀝湯調下二錢

寒水散　治肝風暴赤目睛偏視

青黛一錢　大豆去皮三錢　馬牙消二錢

黃連二錢　黃蘗三錢

右件同搗羅爲細末每用一錢蜜少許冷水調成膏排絹作花子如小錢大攤藥於上貼太陽穴病左貼右病右貼左

錢氏羌活膏　治脾胃虛肝氣熱盛生風或取轉過或吐瀉後爲慢驚者亦治傷寒用無不效

羌活去蘆頭　川芎　人參去頭切

白附子炮　赤茯苓去皮已上各半兩　天麻一兩

白殭蠶消故炒黃　乾蠍去毒炒　白花蛇酒浸取肉焙乾

各一分　川附子炮去皮臍　防風去蘆頭切焙

麻黃去節秤各二錢　肉豆蔻　雞舌香母丁香

藿香葉　沉香　木香各二錢

輕粉一字　珍珠末　牛黃各一錢半

龍腦半字　麝香一錢半　雄黃

辰砂各一分已上七味各另研入

右同為細末熟蜜丸劑庭九大豆大每服一二丸

·食前薄荷湯或麥門冬湯溫化下實熱急驚勿

服性溫故也服無時

金砂丹　治中風涎潮失音不語面赤脈浮大數急迷悶口眼喎斜但係風熱之疾半身癱瘓或傷寒剛痓痰涎口噤小兒急慢驚風並皆治之

白花蛇　烏蛇各用酒浸一宿去皮骨各一兩　蠍稍去毒微炒

殭蠶炒　犀角　玳瑁

天麻　人參　茯神

甘草炒各一兩　腦子　麝香

牛黃　雄黃　珍珠末

天竺黃　鐵粉另研各二錢半　銀箔二百五十片

金箔二百五十片於內留七十片爲衣　朱砂五兩通明水飛

右件二十味爲細末再研勻用煉白蜜和爲丸每兩作一十九川金箔爲衣每服一粒煎人參湯化下或竹葉湯亦得新汲水亦得小兒量大小虛實服不拘時候

虎睛膏　治小兒胎風及驚風

虎睛一雙酒浸炙微黃　天麻　乾蠍微炒

烏蛇肉酒浸炙微黃　羌活　獨活

珊瑚研　麝香細研已上各二錢半　金箔爲衣

右件藥擣羅爲末以煉蜜和丸每兩作四十九前項金箔爲衣每服一丸薄荷湯化下不拘時候

丹砂鎮心丸　治小兒心神不寧有時驚悸目睛偏視痰涎不利甚則瘈瘲服之安鎮心神罷驚止搐

朱砂一兩飛研　牛黃一錢　生龍腦

麝香各一錢　鉛白霜二錢　天竺黃二錢已上各細研

天麻二兩明大者　人參半兩　茯苓半兩白者去黑皮

甘草半兩炙

右一十味爲細末與研藥同研勻細煉蜜和丸如鷄頭實大每服一丸煎金銀薄荷湯化下

五味麝香餅子　治小兒驚風發搐目睛斜視胸膈多痰搐搦不定神昏不惺又治變蒸溫壯不解

麝香半錢研　青黛三錢研　全蠍去毒生用一十五枚

蜈蚣一對生用　石膏飛研細一兩

右爲細末研勻湯浸油餅爲丸如梧桐子大捏作餅子每服五七餅子金銀薄荷水化下

祛風墜涎丸　治小兒諸癇

荊芥穗　蜜陀僧　白礬生各半兩

半夏一兩湯洗　朱砂一錢爲衣

右爲細末水糊爲丸如黍米大朱砂爲衣每服三十丸荊芥湯下乳後

青芝散　乳母服之

青黛三錢研別　藍實三兩　白芝麻九兩生用

已上三味同爲末入青黛令勻每服三錢沸湯點

服食後日進二服常服甚效

木香遜氣飲子　治一切氣病噎塞食飲不下

青皮去白　木香　檳榔

陳皮去白各半兩　香白芷二錢半　蘿蔔子半兩炒

藿香葉一兩　甘草半兩炒　人參半兩

枳殼麩炒去瓤半兩

右爲細末每服三錢水一大盞煎至八分去滓溫

服不拘時候

乾蝎天麻散　治小兒慢驚風

乾蝎全者一枚炒　蔓陀羅十朶垂一字　天麻二錢半

乳香研　天南星炮　丹砂各研一分

右六味搗研為細散每服半錢匕薄荷湯調下不拘時候

大惺惺丸　治驚癇百病及諸壞病不可具述

辰砂研為衣　青礞石　金牙石各半錢

雄黃一錢　蟾灰二錢　牛黃二分半另研係一字

麝香半錢另研　龍腦三分半另研係一字　蛇黃醋淬七次三錢

右研勻細水煮蒸餅為丸朱砂為衣如菉豆大每

日兒每服一丸一歲兒每服二丸薄荷湯溫化下食後

牛黃丸　治小兒風癇發即迷悶手足搐掣口內多涎良久不惺

牛黃二錢半　天南星生　白殭蠶生

白附子生各半兩　乾蝎生　麝香細研

半夏湯洗七遍去滑　蟬殼各二錢半　天麻半兩

水銀

右件藥並生用擣羅為末又以水銀一兩煮棗三十枚去皮核與水銀同研令星盡入前藥末和

丸如菉豆大如隔日發者每服煎黃牛乳汁下三丸日三服如驚風即煎荊芥湯下兩丸

太一丸　治胎癇正發未分差後亦宜常服

天漿子（微炒）　蠍稍（各二十一个）　防風

天麻　朱砂（各五錢）　麝香（一錢）

右為細末乳汁調下不拘時候加減服

斷癇丸　治胎風久為驚癇時發時愈

蛇蛻（三寸微炒存重平分）　蟬蛻（炒四枚存重半錢）　牛黃（半錢）

釣藤鉤子　黃耆　細辛

甘草（生已上各半兩）

右爲細末研勻麵糊爲丸如小黍米大每服百丸
內兒三五九人參湯送下不拘時候量兒大小
加減服

人參茯神湯　治諸癇心神不定

羚羊角末　人參　茯神
白鮮皮各一兩　天門冬去心　酸棗人各半兩
天竺黃　甘草炙各一分

右爲細末每服一錢水八分入生薑薄荷各少許
煎四分去滓溫服

寧眠散　治搐搦不得安臥

天南星炮裂　人參去蘆　白附子炮各半兩

乾蠍二十一个生用　乾赤頭蜈蚣一條酒浸酥炙微黃

乳香　血竭各一分

右件同諸藥拌勻每服一字至半錢用酒好少許浸薄荷煎湯調下每兒潮搐服之得眠睡是驗

安神散　截癇安心神

白茯苓二兩　人參　遠志

石菖蒲　白鮮皮各一兩　石膏半兩

犀角屑　甘草炙各一分

右爲細末每服一錢水一盞入去心麥門冬少許

煎五分去滓放溫時時與服

醒風煎　治小兒風癇涎潮發搐不省人事

白花蛇頭一枚自開口者生用　乾蠍全者半兩

牛黃研半錢　丹砂研一分　龍腦研半分

麝香研半錢

右六味擣研爲細末煉蜜和爲煎瓷盒內收每服

一菉豆大薄荷湯水化破服之量小兒大小加

減服

抱龍丸　治壅嗽痰實欲生驚風時作潮熱宜服

天南星二兩牛膽製　天竺黃兩半　雄黃另研二錢半

辰砂另研二錢半　麝香另研一錢半

石爲末將研藥一處拌和勻煉蜜和丸如芡實大

每兩作五十丸煎薄荷甘草湯化下一丸食後

朱砂丸　治小兒疝氣

朱砂一錢比淬重一錢　當門子一枚如皂子大重一分五釐

石燕子燒醋淬五過一錢　木香三字　史君子去殼一錢

訶子炮去核木一錢

石件藥細研如粉用米飲爲丸如黍米大從一丸

至七丸薄荷湯下日二服早晚乳食前各一服

直滴丸　治小兒心氣不足五六歲不能言語

石菖蒲　丹參各二錢　人參切片去蘆頭半兩

天門冬去心　麥門冬去心焙各一兩　赤石脂三錢

右同爲細末煉蜜和丸如菉豆大或麻子大溫水下五七丸至一二十丸不計時候日三四服久服取效

天麻煎丸　治小兒一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足搐搦精神昏憒痰涎不利

天麻去蘆頭　防風去蘆頭　人參去蘆頭各一兩

白殭蠶炒　乾蠍炒　朱砂研水飛

雄黃研　甘草炙已上各半兩　麝香

牛黃（研各二錢半）

右爲細末煉蜜爲丸每兩作四十九丸每服一丸至二丸薄荷湯化下不拘時候

十珍餅子　治大人小兒嘔吐痰涎粥藥難停無問新久服之愈

丁香　沉香　木香

桂（去皮）　藿香　肉豆蔻

吳茱萸（洗焙乾已上各半兩）　半夏（湯洗七遍畢乾一兩生薑汁製）

舶上硫黃　水銀（各七錢半研細結沙子）

右件搗羅爲細末同研勻煉蜜和丸如小豆大煎

作餅子每服一餅生薑湯下或化服亦得量病加減服不拘時候

金瓜丸　治小兒肌熱盜汗瘦弱飲食不進常服退肌熱肥孩兒大有神效

黃連　黃蘗　青皮

甘草已上各半兩

右爲細末入麝香半錢取豮猪膽和釀在膽內用漿水煮十餘沸取出東房山頭掛一夜第二日丸作菉豆大每服十丸加至二十丸溫米飲送下不拘時候

八物定志丸　補心氣安精神

遠志去心　麥門冬去心　菖蒲

茯神去皮木　茯苓去皮白者已上各一兩　牛黃一錢

白朮一分　人參六錢

右爲細末煉蜜爲丸每一兩作三十丸以朱砂爲衣每服一丸人參湯化下食後

無價散　治斑瘡發出不快

人貓豬狗臘辰燒　少許微將蜜水調

百者救生無一死　萬鋌黃金也何銷

右將前四物於臘日早晨日未出盛貯於銷一鋌

銀鍋子內用木炭火大滾煅令煙盡白色為度

但發瘡似覺有瘡或發不快倒摧黑陷一切惡

瘡並皆治之得遇小童但覺瘡證每用藥一字

用蜜調服萬無一失據此藥工效無可揚以無

價散呼之

鈎藤丸　治小兒治風癇時發時止歲月不休常服

除根元

鈎藤　川升麻　犀角鎊

黃芩去黑心　玄參　茯神

防風去蘆　秦艽　檳榔

黃連　大黃　地骨皮

天竺黃　甘草炙　牙消

麥門冬去心　龍齒　琥珀

青黛　珍珠另研　麝香

牛黃　丹砂另研　龍膽草已上各一兩

蜣螂去頭足翅　蟬去頭足翅各三个　生人參一兩

金箔　銀箔各四十片同研　虎睛一對酒浸炙乾

右件除另研外爲細末軟飯丸如黃米大每一歲兒服二十丸至三十丸人參湯或薄荷湯下

牛黃丸　治法同前鈎藤丸治法同

白花蛇酒浸 人參 茯神

獨活已上各半兩 釣藤一分 腦子

麝香 牛黃已上各一錢 朱砂另研三錢

雀兒飯甕三十个

右件除研藥外為末後同研令勻煉蜜丸一兩作三十丸金箔為衣每一歲兒服一丸人參湯或薄荷湯化下

丹砂虎睛丸 治小兒諸驚癇兼壓驚鎮心藏

丹砂半兩 虎睛一隻 牛黃研

麝香研 犀角末各一錢一字 釣藤二兩

白茯苓去黑皮剉　黃芩去黑　人參

梔子人杞各兩　大黃濕紙裹煨熟剉一兩

右件擣羅為末煉蜜為丸如雞頭實大每服一丸至二丸煎金銀湯化下人參湯亦得更量兒大小加減

郁李人丸　治襁褓小兒大小便不通并驚熱痰實欲得溏動

川大黃一兩去粗皮取實者剉酒浸半日控乾炒為細末

郁李人一兩去皮　滑石半兩細研

右先將郁李人研成膏和大黃滑石丸如黍米大

量大小與之以乳汁或薄荷湯下

射蟾丸　治驚風涎熱潮搐

大乾蟾二錢匕　鐵粉三錢匕　朱砂末二錢匕

青礞石末　雄黃末　蛇黃燒取末各二錢匕

龍腦一字匕　麝香各一錢匕別研

右件研勻水浸蒸餅心丸如梧桐子大朱砂為衣

薄荷水化下半丸至一丸無時

七味羌活膏　治急慢驚風壯熱發搐

羌活　獨活　烏蛇肉酒浸一宿焙各一兩

天麻　全蝎　白殭蠶

人參各半兩

右為細末煉蜜和丸如皂角大每兩作五十丸每服一丸煎荆芥湯化下

胡黃連丸　鎮驚散熱截疳

胡黃連　黃連各半兩　朱砂一分另研

右上三味為細末研入朱砂末都填在粽豬膽內用淡漿水煮以杖子於銚子上用線釣之勿着底候一炊久取出研入蘆薈麝香各一分飰丸黄米大每服十丸至二十丸至三十丸食後米飲下

加減益黃散　治小兒胃虛脾弱腹脇滑泄等疾

肉豆蔻　陳皮去白　訶子皮各半兩

丁香二錢　甘草炙二錢半

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分食前溫服

去青皮加肉豆蔻

固腸丸　治小兒脾胃不和腸滑泄瀉

木香　肉豆蔻麪裹煨以麪熟去麪用　縮砂人

赤石脂　厚朴薑製　川薑

右各等分爲細末麪糊爲丸如黍米大每服三十

丸至五十丸乳食前煎草節湯下

木香豆蔻丸　治小兒泄痢不止進食和氣

木香　草豆蔻八　檳榔

陳皮　青皮去白各一兩　京三稜四兩

肉豆蔻

右為細末麵糊為丸如黃米大每服五十丸棗湯下

豆蔻香連丸　治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣客於腸間下赤白痢腸胃疞痛日夜頻併不欲乳食並皆治之

木香半兩　黃連三分去鬚微炒　肉豆蔻二分

丁香一分　訶黎勒半兩煨去皮

右為細末粟米粥和丸如黍米大三歲小兒每服十丸乳食前溫服米飲下更量大小加減

駐車丸　治一切下痢無問新久冷熱膿血腸滑裏急日夜無度腸腹絞痛不可忍

黃連去鬚三兩　當歸去蘆頭一兩半　乾薑一兩

阿膠搗碎炒如珠子一兩半為末以醋四升熬成膏

右為細末以阿膠膏和併手丸如黃米大每服三十丸乳食前溫米飲下日三服

黃連阿膠丸　治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白狀

如魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴大便不利

黃連三兩去鬚 茯苓二兩去粗皮 阿膠一兩炒為末

右黃連茯苓同為末水調阿膠和衆手丸如黃米大每服二十丸乳食前溫米飲下

虎睛丸 治小兒二十四種驚癇壯熱手足嘔逆夜啼臥睡不安驚癇

虎睛一對微炙細研 牛黃 梔子仁

白茯苓各半兩 人參去蘆頭 鈎藤

川大黃 黃芩已上各一兩 生犀角屑二兩

蛇蛻皮

右件藥搗羅為末細研令勻煉蜜和丸如梧桐子大三歲兒每服以熟水研破一丸服之三四歲兒每服二丸以粥飲下亦得更隨兒大小以意加減

溫白丸　治小兒脾氣虛困泄瀉瘦弱冷疳洞利及因吐瀉或久病後成慢驚身冷瘛瘲

天麻生半兩　白殭蠶炮　白附子生

乾蠍去毒　天南星剉湯洗七次焙各一分

右同為末湯浸寒食麵為丸如菉豆大丸了仍於寒食麵內養七日取出未及養七日合成便服之每服五七

丸至三二十丸空心煎生薑棗飲下漸加丸數多與服

異功散　溫中和氣治吐瀉不思乳食凡治小兒虛冷病先與數服以正其氣

人參去蘆頭　茯苓去皮　白朮

甘草　陳橘皮各等分

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗二枚同煎至七分食前溫熱服量多小與之

丸衞生方薰陸香丸　治小兒虛風慢驚潮搐瘈瘲安神魂益心氣

血竭 半兩　乳香 二錢半本方說分

右件同研細用火上炙爲丸乾時滴水丸如酸棗大每服一丸薄荷湯化下不計時候家傳如夏月嬰兒患上件疾證爲細末薄荷人參湯調下不拘時候

正舌膏　治小兒風病搐搦機關不利喫乳難至於不能發聲者此因病作之後風邪客於舌之絡脉而致此也服之累效

天麻 明大者　白殭蠶 直者去絲炒　大葉薄荷 鄆州者各半兩

上好朱砂 飛研一分計一錢半半入藥一半爲衣

麝香一錢研　腦子

右除砂者外爲末研勻煉蜜和丸如榛子大每服一丸薄荷湯化下臨時服少許朱砂爲衣

訶棃勒散　治小兒脾胃氣弱不欲乳食四肢不和

訶棃勒　陳皮去白各半兩　黃耆去蘆頭

藿香葉　白术　白茯苓

桂心各一分　甘草炙半分

右爲麤散每服一錢水一小盞入生薑少許棗一枚同煎至五分去滓温服食前

均氣散　治脾肺氣逆喘嗽面浮胸膈痞悶小便不

利

桑白皮二兩　陳皮去白一兩半　桔梗

甘草炙　赤茯苓各一兩　藿香葉半兩

木通四兩

右爲麤末每服二錢水一小盞入生薑一二片煎

至五分去滓溫服食前

雄黃丸　治小兒諸般驚癇初降誕下便與乳母

帶碎諸驚忤之氣

雄黃一兩　虎頭骨三分炙　麝香一分

猴猻頭骨三分炙　白龍腦一分　大蛇頭一枚炙

乳香一分　降真香一兩末　箋香一兩

白交香一兩　鬼臼大毛一兩末

右件都研勻細用熟棗肉和丸如彈子大初降誕

兒煎熱一丸大用絳絹袋子帶一丸於身碎一

切驚忤之氣

凡新　降誕兒浴法用豬膽一枚投湯中令不生瘡

疥湯中勿添生水浴訖斷臍

降誕三日浴法

桃根　李根　梅根各二兩拍

右三味以水八升煎二十沸去滓浴之去不祥令

身無疹痍一方煎成去滓入麝香末少許

犀角散　治小兒驚熱睡卧不安筋脈抽掣

犀角　人參去蘆頭秤　茯神

甘草炙　黃芩各一錢　生乾地黃

麥門冬去心　龍齒各二錢

右件同爲細末每服一錢水半小盞煎至五分去滓溫服不拘時候

天漿子散　治小兒初降誕斷臍了便傅此散免一臍內疾

天漿子三錢　亂髮燒灰存性一錢　蜈蚣二寸燒灰

羚羊角一錢燒灰　麝香一小豆大

右五味研令極細纔斷了臍便用少許傅之

鐵粉丸　壁鼠涎

水銀　鉛二味同結沙子共研一分

鐵粉一錢一字　輕粉一錢　天南星一錢一字去臍炮爲末

右一處研至水銀星盡爲度生薑汁麵糊和丸如

粟米大每服十五丸至二十丸生薑湯送下

錢氏地黃丸　治小兒本氣虛怯由胎氣不成則神

不足目中白睛多其顱即解開而色晄白又腎氣

不足則下竄蓋骨重惟欲墜於下而縮身也腎水

陰也腎虛則畏明目無睛光者並宜補之

熟乾地黃八錢焙秤　山茱萸　乾山藥各四錢

澤瀉　牡丹皮　白茯苓去皮各三錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作五十丸三歲已下每服一二丸至三丸溫水空心化下

錢氏浴體天麻散　治小兒百日內發搐真者不過三兩次必死假者發頻不爲重真者內生驚癇假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治之可發風邪用浴體塗顖法

天麻末二錢　蠍尾去毒為末　朱砂各半錢匕

烏蛇肉酒浸焙為末　白礬各三錢　麝香一字匕

青黛三錢匕

右同研勻每服三錢水三椀桃枝一握并葉五七枝同煎至十沸溫熱浴之勿浴背

大青膏　治小兒外感風寒呵欠頓悶口中氣熱肝主風實則目直大　虛則㖞牙多欠又胸滿短氣惡喘嗽上氣故當發散之又治小兒外傷寒其候伸欠頓悶口中氣熱或怕畏人惡風脈浮者並宜服之

天麻末一分　白附子末生一錢半　朱砂研一字匕

青黛一錢研　麝香一字匕　烏蛇梢肉酒浸焙乾取末半錢

天竺黃一字匕研　蠍尾去毒生半錢

右同再細研勻生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷湯化一處服之五歲已上同甘露散服之

安神丹　治小兒心神不寧困臥多睡及痰涎壅塞恍惚不定

朱砂二錢半　南乳香半兩　酸棗人炒去皮一兩

人參二錢半　遠志去心一錢半用淨數

右五味為細末煉蜜丸如櫻子大金箔為衣每服一丸人參湯化下每兩作三十丸

瀉白散　治小兒肺氣壅塞壯熱飲水喘悶及胸滿短氣氣急喘嗽痰涎窒塞唇深紅色者並宜服之

地骨皮洗去土　桑白皮細剉炒黃各一兩　甘草炒半兩

右為細末每服一二錢水一中盞入粳米百粒同煎至六分去滓食後溫服

十味麝香餅子　治小兒風癇潮熱痰壅及口眼偏斜項背強直目睛上視並皆治之

川烏頭炮去皮　天南星炮　白花蛇肉

乾蠍稍炒一兩　乾赤頭蜈蚣二條酒浸炙乾上並研羅為細末

真好麝香半兩別研　乳香別研　鐵粉別研

朱砂別研　牛黃別研各一分

右件都一處研細拌勻滴打白麪糊和為餅子如雞頭實大每服一粒至二粒煎人參薄荷湯化下量兒大小加減

蘆薈丸　治小兒疳氣羸瘦面色萎黃腹脇脹滿頭足作穗揉鼻咬甲好喫泥土利色無定寒熱往來目澁口臭齒齗爛畢常服長肌肉退黃殺疳蟲進飲食

乾蝦蟆　大皂角已上三味等分同燒灰存性為末每末一兩入下

青黛一分　蘆薈　麝香

朱砂各一錢

右為細末湯浸蒸餅為丸如麻子大三歲兒服十五丸米飲湯下量兒大小加減用之

史君子丸　治小兒五疳或抓頭揉目或頭焦筋青下痢頻多久而不瘥轉甚羸瘦並皆治之

史君子用仁二兩　丁香　木香

厚朴薑製　沒食子　胡黃連

肉豆蔻已上各一兩　蘆薈　麝香各一錢

右件爲細末粟米飦爲丸如黍米大每服一十五丸米飲湯送下食前

瀉青丸 又名瀉肝丸 減大黃 治小兒肝臟實熱手尋衣領及亂捻物目直視不搐得心熱則搐身反折強直目連劄或目內青者或臟腑泄瀉諸藥不能止者以致脾胃久虛亦宜服之

當歸 去蘆頭切焙秤　龍膽 焙乾　川芎

山梔子人　大黃 濕紙裹煨　羌活

防風 去蘆頭切焙秤各一兩

右爲細末煉蜜和丸每兩作三十丸每服半丸至

一丸煎竹葉湯同沙糖溫水化下

全蠍散　治小兒急慢驚風搐掣痰瘀痰實壅塞胸膈不利

全蠍十一个　朱砂研　乾烟脂各一錢

薄荷四錢

右爲細末每服半錢乳汁調下

阿膠散　治小兒肺氣虛怯脣內色悶亂氣麤喘促哽氣長出氣皆肺虛損故也宜補之

阿膠二兩半麩炒　黍黏子炒　甘草炒各一分

馬兜鈴半兩　糯米一兩炒　杏人七个去皮尖

右爲末每服一二錢水一盞煎至六分去滓服食後

菖蒲煎丸　治小兒肺氣壅實咳嗽痰涎喘鳴肩息


人參　石菖蒲　款冬花

桂心　紫苑茸已上各一錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作三十丸每服一丸煎糯米湯化下食後服

錢氏白朮散　治小兒吐瀉之後腹中爽痛氣不和煩渴引飲不止及傷寒下後胃中虛熱飲水無以

治生胃中津液多服愈佳常多煎不代水



癸巳新刊御藥院方卷第十一

御藥院昉于宋有勾當官有典有藥童掌按驗秘方以時和藥以進御及供奉禁中之用金元因之蓋唐尚藥局也此書不題撰人姓名按翰林學士高鳴序云太醫提點榮祿許公暨二三僚友取御藥院壬寅所刊方書板正其訛補其缺求其遺亡而附益之元史許國禎傳世祖即位錄前勞授榮祿大夫提點太醫院事壬寅元太宗十四年此時未建年號乃宋淳祐三年也由此觀之其書係于元太宗朝諸醫官所集高序成乎至元四年距壬寅二十五年許遷禮部尚書在至元十二年乃知所謂許公者為國禎無疑

矣又按政和本草中收御藥院方者十餘道今考諸此書無一所見而宋藝文志馬氏經籍考俱不載其目蓋宋舊有御藥院方而佚已久矣徐東臯於古今醫統中引此書方藥而於採摭書目則云宋太宗朝無名氏集抑攷核之不審也元人方書李明之羅天益王好古危亦林薩德彌實李仲南孫允賢等之外流傳未廣此乃輯宋末金源諸方者頗備亦寶架中不可欠之書也壬子夏日借抄于佐伯侯島標紅栗齋因記其后爾是歲重九卅波元簡廉夫書

寛政初元
國家布維新之政再修學校而令朝士志於醫者入學焉乃課講習使長於技者代辨診脉論病證講方書而學者皆孳孳有所進云旣有學政則又不可以不廣貯其書也於是乎所謂秘于帳藏于山之書亦無日不至焉佐伯侯有鄰侯之好其富典籍聞於海內藏中有元御藥院方法眼多紀君乞而騰之余從而借讀之多備所未聞之方乃知彼時典藥者承詔集之以考異同無所不搜也旣得斯書又思公之因僦工而上木授之海內學醫者觀斯多方庶乎有補

於　政化之萬一云爾

戊午仲冬

醫官法眼千賀芳久識

右御藥院方十一卷倣乾隆聚珍之式

擺字刷印凡貳百有五十部以廣其傳

原本舛錯不遑僂指今釐訂其可攷者

以待後之君子爾